



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1250 N Wells St, Ste A, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

INSTRUCCIONES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON RELLENO DÉRMICO

Para asegurar resultados óptimos del tratamiento, es importante que lea esto cuidadosamente. Su firma abajo indica que ha leído estas instrucciones en su totalidad y que comprende completamente la necesidad de notificar a nuestra oficina inmediatamente si está experimentando cualquier efecto adverso o anomalía no listada a continuación.

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO

- Inmediatamente después de una sesión de inyección de relleno dérmico, puede aparecer enrojecimiento, hinchazón y/o moretones en el área tratada. Para reducir el riesgo de edema y/o moretones después de la inyección, se aplica una bolsa de hielo envuelta en tela (evite cualquier contacto directo del hielo con la piel) en las áreas tratadas.
- Puede tomar un mínimo de 3-6 semanas para que los resultados del tratamiento se asienten.
- Los moretones leves y la hinchazón son normales y esperados.
- Pueden ocurrir temporalmente bultos y/o protuberancias en o a lo largo del(los) sitio(s) de tratamiento. Estos se resolverán con el tiempo y rara vez son motivo de preocupación.
- El dolor leve en el sitio de inyección es normal y esperado. El dolor puede durar hasta una semana después del tratamiento.
- La asimetría e irregularidad del tejido tratado es común después del tratamiento y usualmente se resuelve por sí sola.



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1250 N Wells St, Ste A, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

- Dentro de las primeras 24 horas, se puede aplicar una bolsa de hielo envuelta en tela (evitando cualquier contacto directo del hielo con la piel) en el área tratada para reducir la hinchazón y los moretones.
- El relleno dérmico puede causar enrojecimiento, hinchazón o moretones cuando se inyecta por primera vez en la piel, resolviéndose típicamente en horas hasta una semana. También puede ocurrir hematoma, resolviéndose típicamente en horas hasta aproximadamente dos semanas. Los síntomas o signos que empeoren o se prolonguen deben ser reportados al proveedor de atención médica. La depresión original de la piel puede reaparecer inicialmente, pero debería mejorar gradualmente dentro de varias semanas a medida que el relleno dérmico se asienta.
- El proveedor de atención médica evaluará la necesidad de sesiones adicionales de inyección de relleno dérmico después de al menos 2-4 semanas.
- El maquillaje estético puede aplicarse 24 horas después del tratamiento si no hay complicaciones presentes.
- La exposición del área tratada al sol, lámparas UV y temperaturas extremas debe evitarse hasta que cualquier hinchazón y enrojecimiento inicial hayan desaparecido. Los pacientes deben ser informados sobre la protección solar adecuada según el consejo del médico.
- Evite el ejercicio durante 24 horas después del tratamiento.
- Siga diligentemente las instrucciones de su especialista respecto al uso de antihistamínicos si es propenso a alergias estacionales.
- Si experimenta clima severo o cambios dramáticos en la presión atmosférica en su ubicación geográfica, puede experimentar una mayor hinchazón o complicaciones de lo normal.
- Para evitar hinchazón adicional, duerma con la cabeza elevada durante 2-3 días después del tratamiento.
- Evite lavar su rostro durante 12 horas después del tratamiento.



New Image Works

3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1250 N Wells St, Ste A, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

CONTÁCTENOS en la ubicación de Glenview 224-432-5803, en la ubicación de Chicago 312-638-4979 o en Aventura, FL 786-438-0778 si usted:

1. Experimenta aumento de enrojecimiento, hinchazón o dolor en el sitio de inyección.
2. Tiene uno o más hilos que comienzan a sobresalir.
3. Tiene preguntas o inquietudes adicionales respecto a su tratamiento o seguimiento del tratamiento.