



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1250 N Wells St, Ste A, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

INSTRUCCIONES PRE Y POST TRATAMIENTO PARA NEUROTOXINA

¿Qué es una neurotoxina?

Las neurotoxinas se utilizan para el alivio temporal de las arrugas (rítides), más comúnmente en la frente, entrecejo y la zona de las “patas de gallo”.

Existen 4 neurotoxinas comúnmente utilizadas en los Estados Unidos: Botox, Dysport, Jeuveau y Xeomin. Nuestra práctica ofrece las primeras 2. Todos estos productos son muy similares en naturaleza y efecto, con diferencias sutiles entre ellos.

Un pequeño porcentaje de personas puede ser resistente a una o más de estas toxinas. Por lo tanto, si el tratamiento no es completamente efectivo, es posible que responda mejor a otra opción.

La toxina en sí es un medicamento fabricado médicamente que se origina de una bacteria que produce una toxina asociada con el botulismo. Aunque esto suena preocupante, estas toxinas se han utilizado en medicina durante décadas y tienen muchos usos además del estético, incluyendo el tratamiento de migrañas y espasmos musculares.

Su seguridad y eficacia han sido ampliamente comprobadas.

Los efectos de estas toxinas duran entre 2 y 4 meses.

La toxina bloquea la transmisión de señales del nervio al músculo, lo que evita que el músculo se contraiga completamente, reduciendo así la aparición de líneas en las áreas tratadas.

También existen otras áreas del rostro que pueden tratarse con Botox, como el labio superior o incluso el cuello. Estos tratamientos se consideran “uso fuera de etiqueta” (off-label) por la FDA. Su proveedor le explicará qué significa esto. En general, significa que el medicamento es seguro y efectivo, pero no ha sido específicamente aprobado por la FDA para ese uso.



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1250 N Wells St, Ste A, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

Es muy importante expresar sus inquietudes y tener una consulta detallada con su proveedor, especialmente en su primer tratamiento o si es su primera vez en nuestra clínica.

Instrucciones previas al tratamiento:

- Para obtener resultados óptimos y minimizar el riesgo de sangrado o moretones, evite todos los medicamentos y suplementos anticoagulantes durante tres días antes de su cita. Esto incluye medicamentos de venta libre como aspirina, ibuprofeno, Motrin y Aleve.
- También evite suplementos herbales como ajo, vitamina E, ginkgo biloba, hierba de San Juan y omega-3.
- Si tiene antecedentes cardiovasculares, consulte con su médico antes de suspender la aspirina.
- No utilice neurotoxinas si es alérgico a alguno de sus ingredientes o si tiene una infección en la piel en el área a tratar.

Instrucciones posteriores al tratamiento:

- Evite tocar su rostro y usar maquillaje el día del procedimiento.
- Evite movimientos excesivos o masajes en el área tratada, a menos que su proveedor lo indique.
- Evite el bronceado, la exposición solar intensa o el calor durante 24 horas (sin sauna ni jacuzzi).
- Evite ejercicio intenso o cualquier actividad que aumente su frecuencia cardíaca durante 24 horas.
- Evite consumir alcohol o sodio en exceso el día del tratamiento para prevenir hinchazón excesiva.
- No se acueste ni se incline con la cabeza hacia abajo durante las primeras 4 horas después del tratamiento. Por favor, agáchese doblando las rodillas en lugar de inclinarse por la cintura durante este tiempo.
- Si aparece moretón en el sitio de la inyección, aplique hielo en intervalos de 10 minutos encendido / 10 minutos apagado durante las primeras 24 horas mientras esté despierto.



New Image Works

3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1250 N Wells St, Ste A, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

- Evite faciales, masajes y exfoliación del área durante un día después del procedimiento.
- Espere hasta el día siguiente para usar sombreros o bandas para la cabeza.
- Use Tylenol (acetaminofén) para dolor o molestias. No use AINEs (ibuprofeno, aspirina) durante 24 horas ya que pueden aumentar el sangrado.
- Si es su primer tratamiento con neurotoxina, realice una cita de seguimiento 2 semanas después para reevaluación y fotos de “después”. Esto ayudará a determinar la dosis adecuada para su próximo tratamiento.
- Las neurotoxinas duran en promedio entre 2 y 4 meses. Se recomienda programar su próxima cita al momento del tratamiento para obtener el máximo beneficio.

Los efectos secundarios más comunes son dolor de cabeza, moretones, hinchazón y enrojecimiento. Estos son temporales y desaparecerán.

Sin embargo, por favor llame a la oficina al 224-432-5803 si experimenta cualquier efecto secundario adicional.