



New Image Works  
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803  
1250 N Wells St, Ste A, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979  
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

---

## INSTRUCCIONES POSTERIORES AL TRATAMIENTO CON SCULPTRA

Para asegurar resultados óptimos del tratamiento, es importante que lea esto cuidadosamente. Su firma abajo indica que ha leído estas instrucciones en su totalidad y que comprende completamente la necesidad de notificar a nuestra oficina inmediatamente si está experimentando cualquier efecto adverso o anomalía no listada a continuación.

## RESULTADOS DEL TRATAMIENTO

- Inmediatamente después de una sesión de inyección de Sculptra, puede aparecer enrojecimiento, hinchazón y/o moretones en el área tratada. Para reducir el riesgo de edema y/o moretones después de la inyección, se aplica una bolsa de hielo envuelta en tela (evite cualquier contacto directo del hielo con la piel) en las áreas tratadas. Consulte EVENTOS ADVERSOS para detalles de la incidencia y gravedad de eventos adversos observados inmediatamente después de la inyección durante el ensayo clínico.
- Para ayudar a que Sculptra se distribuya de manera uniforme en la deficiencia de contorno, es importante al final de la sesión de tratamiento masajear manualmente en forma circular el área tratada durante un mínimo de 2 minutos. Se debe usar un humectante facial para realizar el masaje.
- La aparición temprana de nódulos subcutáneos en el sitio de inyección (dentro de 3 a 6 semanas después del tratamiento) puede minimizarse siguiendo técnicas adecuadas de dilución e inyección (por ejemplo, evitando inyecciones superficiales o sobrecorrección). Además, masajear el área tratada para asegurar una distribución adecuada del producto también puede minimizar la aparición de nódulos.
- Los nódulos generalmente se resuelven espontáneamente. Sin embargo, como se ha reportado en la literatura publicada, algunos nódulos pueden requerir tratamiento médico como subcisión (ruptura de los nódulos con solución salina estéril), y la aparición tardía de nódulos subcutáneos en el sitio de inyección (generalmente se manifiestan dentro de 3 a 4 meses después del tratamiento) puede requerir tratamiento como inyecciones intralesionales de corticosteroides, subcisión y/o escisión.



## New Image Works

3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803  
1250 N Wells St, Ste A, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979  
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

---

- Puede tomar un mínimo de 12 o más semanas para que los resultados del tratamiento sean notorios.
- Los moretones leves y la hinchazón son normales y esperados.
- Pueden ocurrir temporalmente bultos y/o protuberancias en o a lo largo del(los) sitio(s) de tratamiento. Estos se resolverán con el tiempo y rara vez son motivo de preocupación.
- El dolor leve en el sitio de inyección es normal y esperado. El dolor puede durar hasta una semana después del tratamiento.
- La asimetría e irregularidad del tejido tratado es común después del tratamiento y usualmente se resuelve por sí sola.

### INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

Se recomienda que la siguiente información sea compartida con los pacientes por el proveedor de atención médica:

- Dentro de las primeras 24 horas, se debe aplicar una bolsa de hielo envuelta en tela (evitando cualquier contacto directo del hielo con la piel) en el área tratada para reducir la hinchazón y los moretones.
- Sculptra puede causar enrojecimiento, hinchazón o moretones cuando se inyecta por primera vez en la piel, resolviéndose típicamente en horas hasta una semana. También puede ocurrir hematoma, resolviéndose típicamente en horas hasta aproximadamente dos semanas. Los síntomas o signos que empeoren o se prolonguen deben ser reportados al proveedor de atención médica. La depresión original de la piel puede reaparecer inicialmente, pero debería mejorar gradualmente dentro de varias semanas a medida que ocurre el efecto del tratamiento con Sculptra. El proveedor de atención médica evaluará la necesidad de sesiones adicionales de inyección de Sculptra después de al menos 4–6 semanas.
- Se recomienda masajear en forma circular las áreas tratadas durante 5 minutos, 5 veces al día durante 5 días después de cualquier sesión de inyección, según el consejo del médico.
- El tratamiento con Sculptra puede resultar en pequeñas pápulas en el área tratada. Estas pápulas subcutáneas generalmente no son visibles y son asintomáticas y pueden notarse solo al presionar el área tratada. Sin embargo,



## New Image Works

3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803  
1250 N Wells St, Ste A, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979  
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

---

se han reportado nódulos visibles, a veces con enrojecimiento o cambio de color de la piel. Los pacientes deben reportar estos eventos y cualquier otro efecto secundario a su proveedor de atención médica.

- El maquillaje estético puede aplicarse unas horas después del tratamiento si no hay complicaciones presentes.
- La exposición del área tratada al sol, lámparas UV y temperaturas extremas debe evitarse hasta que cualquier hinchazón y enrojecimiento inicial hayan desaparecido. Los pacientes deben ser informados sobre la protección solar adecuada según el consejo del médico.
- Evite el ejercicio durante 24 horas después del tratamiento.
- Siga diligentemente las instrucciones de su especialista respecto al uso de antihistamínicos si es propenso a alergias estacionales.
- Si experimenta clima severo o cambios dramáticos en la presión atmosférica en su ubicación geográfica, puede experimentar una mayor hinchazón o complicaciones de lo normal.
- Para evitar hinchazón adicional, duerma con la cabeza elevada durante 2-3 días después del tratamiento.
- Evite lavar su rostro durante 12 horas después del tratamiento.
- No use maquillaje ni aplique cremas faciales durante 48 horas después del tratamiento.

**CONTÁCTENOS en la ubicación de Glenview 224-432-5803, en la ubicación de Chicago 312-638-4979 o en Aventura, FL 786-438-0778 si usted:**

1. Experimente aumento de enrojecimiento, hinchazón o dolor en el sitio de inyección.
2. Tenga uno o más hilos que comiencen a sobresalir.
3. Tenga preguntas o inquietudes adicionales respecto a su tratamiento o seguimiento del tratamiento.