New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1348 N Wells St, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

INSTRUCCIONES PREVIAS AL TRATAMIENTO CON RELLENOS DÉRMICOS

Para garantizar el tratamiento más seguro posible y los mejores resultados, siga estas instrucciones antes de su cita.

PARA PREVENIR INFECCIONES

- No usar maquillaje el día del tratamiento; acuda con el rostro limpio.
- No tener infecciones cutáneas activas o heridas en ninguna parte del cuerpo.
- No realizar trabajos dentales (incluyendo limpiezas, limpiezas profundas, extracciones o cirugías) durante 4 semanas antes y 4 semanas después del tratamiento con relleno dérmico.
- No someterse a procedimientos quirúrgicos durante 4 semanas antes y 4 semanas después del tratamiento.
- No tener herpes labial activo. Si siente que está comenzando, contáctenos para reprogramar.
- Si está tomando Accutane (isotretinoína), debe esperar 6 meses después de la última dosis antes de realizarse rellenos dérmicos.

PARA PREVENIR O MINIMIZAR MORETONES E HINCHAZÓN

- Suspenda todos los suplementos que puedan aumentar el sangrado o los moretones (incluyendo aceite de pescado, vitamina E, preparaciones herbales como ginkgo, ajo, hierba de San Juan) 2 semanas antes del procedimiento.
- Evite el alcohol durante 72 horas antes del tratamiento.
- No consuma café ni bebidas con cafeína durante 6 horas antes de su cita.
- No haga ejercicio ni actividades intensas durante 6 horas antes del procedimiento.
- Suspenda los AINEs (ibuprofeno, naproxeno, etc.) 2 semanas antes si es posible, a menos que su médico los haya recetado; no suspenda medicamentos recetados sin consultar con su proveedor de salud.
- No fumar ni vapear durante 6 horas antes del procedimiento.

NOTAS IMPORTANTES

- Infórmenos sobre todos los medicamentos, alergias y condiciones médicas.
- Notifíquenos inmediatamente si desarrolla alguna enfermedad, infección cutánea o herpes labial antes de su cita.
- Seguir estas instrucciones ayuda a reducir el riesgo de infección, moretones y complicaciones, y mejora su recuperación y resultados.

INSTRUCCIONES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON RELLENO DÉRMICO

Para obtener resultados óptimos en New Image Works med spa, es esencial revisar cuidadosamente estas instrucciones. Al firmar a continuación, confirma que ha leído y comprende completamente las pautas. Si experimenta efectos secundarios inesperados o anomalías no mencionadas, por favor contacte nuestra oficina de inmediato para recibir asistencia. Su seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO

- Inmediatamente después de una sesión de inyección de relleno dérmico, puede aparecer enrojecimiento, hinchazón y/o moretones en el área tratada. Para reducir el riesgo de edema y/o moretones después de la inyección, se aplica una compresa fría envuelta en tela (evite el contacto directo con la piel).
- Puede tomar un mínimo de 3 a 6 semanas para que los resultados del tratamiento se estabilicen.
- Los moretones e hinchazón leves son normales y esperados.
- Pueden aparecer temporalmente bultos en el área tratada. Estos desaparecerán con el tiempo y rara vez son motivo de preocupación.
- El dolor leve en el sitio de inyección es normal y puede durar hasta una semana.
- La asimetría o irregularidad del tejido tratado es común después del tratamiento y generalmente se resuelve sola.

New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1348 N Wells St, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

- Durante las primeras 24 horas, se puede aplicar una compresa fría envuelta en tela (evitando contacto directo con la piel) para reducir hinchazón y moretones.
- El relleno dérmico puede causar enrojecimiento, hinchazón o moretones, que normalmente desaparecen en horas o hasta una semana. Un hematoma también puede ocurrir y generalmente desaparece en horas o hasta dos semanas. Si los síntomas empeoran o persisten, informe a su proveedor de salud.
- El proveedor evaluará la necesidad de sesiones adicionales de relleno dérmico después de 2 a 4 semanas.
- Se puede aplicar maquillaje estético 24 horas después si no hay complicaciones.
- Evite la exposición al sol, lámparas UV y temperaturas extremas hasta que desaparezca la hinchazón o enrojecimiento. Use protector solar según las recomendaciones del médico.
- Evite hacer ejercicio durante 24 horas después del tratamiento.
- Siga cuidadosamente las instrucciones sobre antihistamínicos si es propenso a alergias.
- Cambios climáticos extremos pueden causar mayor hinchazón o complicaciones.
- Para evitar hinchazón adicional, duerma con la cabeza elevada durante 2-3 días.
- Evite lavar su rostro durante 12 horas después del tratamiento.

Contáctenos si usted:

1. Experimenta aumento de enrojecimiento, hinchazón o dolor en el sitio de inyección.
2. Tiene preguntas o inquietudes adicionales sobre su tratamiento o seguimiento.