



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1348 N Wells St, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

INSTRUCCIONES PRE Y POST TRATAMIENTO PARA KYBELLA/LIPOLÍTICO

Contraindicaciones del tratamiento:

- No eres candidato si estás embarazada, en periodo de lactancia o tienes heridas abiertas en el área de tratamiento.

Instrucciones pre-tratamiento:

- NO uses los siguientes productos 2 días antes o 2 días después de tu tratamiento (o hasta que la rojez haya desaparecido): RetinA, retinoides o compuestos similares de vitamina A, exfoliantes agresivos o productos exfoliantes, o cremas blanqueadoras (a menos que tu proveedor indique lo contrario).
- Caballeros: Afeita el área de tratamiento un día antes de tu tratamiento programado (a menos que tu proveedor indique lo contrario).
- No apliques cremas, lociones, perfume o maquillaje, etc. en las áreas a tratar antes del tratamiento.
- Para disminuir las probabilidades de mareo durante tu tratamiento, asegúrate de haber comido recientemente, incluyendo alimentos y bebidas, antes del procedimiento. Por favor avisa al proveedor si tienes antecedentes de desmayos.
- Programa tu cita de Kybella®/Lipolitic al menos 2-4 semanas antes de un evento especial al que puedas asistir, como una boda o unas vacaciones (debido a moretones e hinchazón prolongada).
- Reprograma tu cita al menos con 48 horas de anticipación si tienes un sarpullido severo, herpes labial o imperfección en el área de tratamiento.
- Evita medicamentos antiinflamatorios/anticoagulantes 10-14 días antes y 3-4 días después del tratamiento. Medicamentos como:
- Aspirina, Vitamina E, Gingko Biloba, Ginseng, Hierba de San Juan, suplementos de Omega 3/Aceite de pescado, Ibuprofeno, Motrin
- Advil, Aleve y otros AINEs tienen un efecto anticoagulante y pueden aumentar el riesgo de moretones e hinchazón después de las inyecciones.
- NO consumas bebidas alcohólicas 1 semana antes del tratamiento (el alcohol puede adelgazar la sangre y aumentar el riesgo de moretones).



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1348 N Wells St, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

- Considera tomar tabletas de Árnica comenzando 1 semana antes de las inyecciones para prevenir moretones.

Instrucciones post-tratamiento:

- Evita temperaturas extremas de calor durante 24 horas después del tratamiento (es decir, jacuzzi, duchas calientes, etc.).
- NO consumas alcohol o sodio durante 3 días después del tratamiento para evitar hinchazón excesiva.
- Evita el ejercicio extenuante durante 24 horas después del tratamiento.
- Duerme boca arriba con la cabeza elevada para disminuir la hinchazón.

Qué esperar:

- Experimentarás hinchazón y moretones durante 3-5 días después del tratamiento, que comenzarán a disminuir durante un período de unas pocas semanas. La hinchazón puede durar de 4 a 6 semanas.
- Muchos pacientes necesitan 2-3 tratamientos para obtener los resultados deseados, por favor programa una cita de seguimiento 4-6 semanas después de tu primer tratamiento.
- Se pueden usar compresas frías en el área tratada durante las primeras 12 horas. Aplica hielo durante 15 minutos cada hora. Sin embargo, puedes suspender el uso de hielo si resulta incómodo.
- NO masajees el sitio de la inyección. Pueden presentarse hinchazón, sensibilidad, moretones, entumecimiento y áreas de nódulos firmes, y se resolverán con el tiempo sin intervención.
- Los resultados no son inmediatos. Los resultados pueden verse tan pronto como 4-6 semanas después del tratamiento, pero los resultados completos no se notarán hasta 12 semanas después del tratamiento. El entumecimiento puede durar hasta 12 semanas.
- No envuelvas el área tratada y no tomes nada para impedir la hinchazón el día del tratamiento ni en los días posteriores.
- Puedes sentir una sensación de pesadez después del tratamiento, especialmente al acostarte boca arriba. Esta sensación puede hacerte sentir con



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1348 N Wells St, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

falta de aire. Sin embargo, Kybella®/Lipolitic no compromete tus vías respiratorias.

Notifica a nuestra oficina si hay

- hinchazón significativa
- sangrado, dolor, decoloración oscura, dificultad para tragar o sonreír, o si aparece fiebre.