New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1250 N Wells St, Ste A, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

INSTRUCCIONES PRE Y POST PARA NEUROTOXINA

¿Qué es una neurotoxina?

Neurotoxinas se utilizan para el alivio temporal de las arrugas (ritides), más comúnmente en la frente, el entrecejo y la zona de “patas de gallo”. Existen 4 neurotoxinas comúnmente utilizadas en los Estados Unidos: Botox, Dysport, Jeaveau y Xeomin. Nuestra práctica ofrece las primeras 2. Todos estos productos son muy similares en naturaleza y efecto, con diferencias sutiles entre ellos. Un pequeño porcentaje de personas será resistente a una o más de estas toxinas. Por lo tanto, si el agente utilizado es ineficaz o menos que completamente efectivo, puede responder mejor a uno de los otros.

La toxina en sí es un medicamento fabricado médicamente cuyo origen inicial proviene de una bacteria que produce una toxina asociada con el botulismo. Aunque suena alarmante, estas toxinas se han utilizado en medicina durante décadas y tienen muchos usos además de los mencionados anteriormente, incluyendo el tratamiento de migrañas y espasticidad muscular. Su seguridad y eficacia han sido ampliamente probadas. Los efectos de estas toxinas duran de 2 a 4 meses. La toxina bloquea la transmisión de información de un nervio local al músculo asociado, y por lo tanto, al no poder el músculo contraerse completamente, hay menos líneas en las áreas comúnmente tratadas. Existen otras áreas del rostro que se tratan con Botox, como el labio superior o incluso el cuello. Estos tratamientos se consideran de uso “off-label” por la FDA, y su proveedor le explicará con más detalle lo que eso significa. En general, significa que el medicamento es seguro y efectivo para ese uso, pero no ha sido específicamente evaluado ni aprobado por la FDA para ese propósito.

En New Image Works Med Spa, la comunicación abierta es clave para lograr los mejores resultados. Expresar sus inquietudes y tener una consulta detallada con su proveedor es esencial, especialmente para su primer tratamiento o su primera visita con nuestra práctica.

Instrucciones previas al tratamiento:

- Para resultados óptimos y para minimizar la probabilidad de sangrado o moretones en el sitio de inyección, evite todos los medicamentos y suplementos anticoagulantes durante tres días después de su cita. Esto incluye medicamentos de venta libre como aspirina, ibuprofeno, Motrin y Aleve. También evite suplementos herbales como ajo, vitamina E, ginkgo biloba, hierba de San Juan y cápsulas de omega-3. Si tiene antecedentes cardiovasculares, consulte con su médico antes de suspender el uso de aspirina.
- No use neurotoxinas si es alérgico a alguno de sus ingredientes o si tiene una infección en la piel en el sitio de inyección planificado.

Instrucciones posteriores al tratamiento:

- Evite tocar su rostro y usar maquillaje el día del procedimiento.
- Evite movimientos significativos o masajes en el área tratada a menos que su proveedor lo indique.
- Evite el bronceado, la exposición solar intensa o el calor durante 24 horas (sin sauna ni jacuzzi).
- Evite el ejercicio intenso o cualquier actividad que aumente su ritmo cardíaco durante 24 horas.
- Evite consumir cantidades excesivas de alcohol o sal para evitar hinchazón excesiva el día de su tratamiento.
- No se acueste ni se incline con la cabeza hacia abajo durante las 4 horas posteriores a su tratamiento. Agáchese en lugar de inclinarse desde la cintura durante este tiempo.
- Si hay moretones en el sitio de inyección, aplique hielo en el área(s) durante 10 minutos encendido, 10 minutos apagado, tanto como sea posible durante las primeras 24 horas mientras esté despierto.
- Evite faciales, masajes y exfoliación del área durante un día después del procedimiento.
- Espere hasta el día siguiente al tratamiento antes de usar sombreros o bandas para la cabeza.
- Use Tylenol (acetaminofén) para dolor de cabeza o molestias. No use AINEs (ibuprofeno, aspirina) durante 24 horas ya que pueden aumentar el sangrado.

- Si este es su primer tratamiento con neurotoxinas, haga un seguimiento 2 semanas después del tratamiento con su proveedor para reevaluación y fotos “después”. Esto nos ayudará a evaluar la dosis adecuada para su próximo tratamiento.

Neurotoxinas duran, en promedio, de 2 a 4 meses. Se recomienda al momento de su tratamiento programar su próxima cita para obtener el máximo beneficio. Los efectos secundarios más comunes son dolor de cabeza, moretones, hinchazón y enrojecimiento. Estos son temporales y desaparecerán.

Sin embargo, por favor llame a la oficina al 224-432-5803 para notificarnos si experimenta algún efecto secundario adicional.