



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1348 N Wells St, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

INSTRUCCIONES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON SUTURAS PDO/PLLA

Para obtener resultados óptimos con los tratamientos de PDO/PLLA en New Image Works med spa, es esencial leer cuidadosamente estas instrucciones. Al firmar a continuación, confirma que las ha revisado completamente y comprende la importancia de notificar a nuestra oficina de inmediato si experimenta algún efecto secundario inesperado o anomalía no mencionada. Su seguridad, comodidad y éxito del tratamiento son nuestras principales prioridades.

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO

- Puede tomar un mínimo de dos o más semanas para que los resultados del tratamiento sean visibles.
- Los moretones e hinchazón leves son normales y esperados.
- Pueden aparecer bultos temporales en el área tratada o a lo largo de los sitios de tratamiento. Estos desaparecerán con el tiempo y rara vez son motivo de preocupación.
- El dolor leve en el sitio de inyección es normal y puede durar hasta una semana después del tratamiento.
- La asimetría o irregularidad del tejido tratado es común después del tratamiento y generalmente se resuelve por sí sola.

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

- Evite el ejercicio durante 24 horas después del tratamiento.
- Siga cuidadosamente las instrucciones de su especialista respecto al uso de antihistamínicos si es propenso a alergias estacionales.
- Si experimenta clima severo o cambios drásticos de presión atmosférica en su ubicación geográfica, puede experimentar mayor hinchazón o complicaciones.
- Evite masticar en exceso y alimentos duros durante 3 días después del tratamiento. No beba con pajilla/popote.



New Image Works
3633 W Lake Ave, Ste 303, Glenview, IL 60026 (224) 432-5803
1348 N Wells St, Chicago, IL 60610 (312) 638-4979
2920 NE 207th Street, Suite 1005, Aventura, FL 33180 (786) 438-0778

- Evite expresiones faciales exageradas durante una semana después del tratamiento.
- Para evitar hinchazón adicional, duerma con la cabeza elevada durante 2-3 días después del tratamiento.
- Evite masajear excesivamente las áreas tratadas.
- Evite lavar su rostro durante 12 horas después del tratamiento.
- No use maquillaje ni aplique cremas faciales durante 48 horas después del tratamiento.
- Mantenga las Steri-Strips durante 3 días. Después de 3 días puede retirarlas.
- Después de retirar las Steri-Strips, aplique Vaselina o pomada Bacitracina en los sitios de inserción durante 10 días.

Contáctenos si usted:

1. Experimenta aumento de enrojecimiento, hinchazón o dolor en el sitio de inyección.
2. Nota que uno o más hilos comienzan a sobresalir.
3. Tiene preguntas o inquietudes adicionales sobre su tratamiento o seguimiento.